F.T.R. RESEARCH AND DEVELOPMENT
CH - 2003 NEUCHATEL / SWITZERLAND
INTER - OFFICE CORRESPONDENCE

To: M. M. Häusermann Date: 29 janvier 1987

From: J. M. Renaud Doc name: emd87d61

Subject: Résultats analyse tabac / REYNOLDS DOUBLE BLEND

Veuillez trouver ci-joint les résultats de l'analyse de tabac effectuée sur des segments de la cigarette Reynolds Double Blend. Quatre segments, définis selon le schéma ci-dessous, ont été analysés :



Résultats analytiques

SEGMENT	TA	RS	$N-NO_3$	$N-NH_3$
SEGMENT 1 *	1.70	10.9	0.19	0.17
SEGMENT 2 *	1.84	9.3	0.21	0.18
SEGMENT 3 *	1.68	10.1	0.18	0.17
SEGMENT 4 *	2.09	9.5	0.21	0.16
MERIT ** Germany	1.77	7.8	0.26	0.23
MARLBORO ** Lights Germany	1.68	8.3	0.21	0.30

* Ces résultats ont été calculés sur la base d'une humidité tabac estimée à 12%.

** Valeurs CIR

Meilleures salutations.

SMOKING LABORATORY

J. M. Renaud

PM3000831721

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/sxpk0001